

**LE RESEAU DE SANTE PARIS-NORD PREND POSITION
EN FAVEUR DE LA VACCINATION H1N1
DES POPULATIONS A RISQUES
ET SOUHAITE QUE LES GENERALISTES
SOIENT ASSOCIES A SA MISE EN PLACE**

1

La vaccination des professionnels de santé contre le virus A(H1N1)2009 est une **nécessité sanitaire**.

- Elle est **indispensable** pour limiter au maximum la transmission de grippe liée aux soins.
- Elle protège le soignant de la grippe, malgré les contacts fréquents avec la maladie.
- Elle protège son entourage familial.

2

Les effets secondaires de cette vaccination sont a priori bénins :

- Réactions locales au site d'injection
- Réactions systémiques bénignes (douleurs musculaires, sensations de malaise, frissons, fièvre)

Les évènements indésirables graves liés aux adjuvants, qui sont déjà utilisés dans différents vaccins, sont rares

Par ailleurs, le syndrome de Guillain-Barré est une maladie rare (2,8 cas pour 100.000 habitants). Une étude a montré que son incidence après une grippe saisonnière pouvait augmenter à 4 à 7 cas pour 100.000 grippés. La plupart des études n'ont pas montré d'association significative entre le syndrome de Guillain-Barré et la vaccination antigrippale (une seule étude a mis en évidence un risque très faible d'environ un cas pour 1 million de vaccinés).

Pour plus d'information sur les effets secondaires, reportez vous aux liens ci-dessous.

3

La vaccination doit être faite le plus précocement possible pour être efficace. Les lieux où vous pouvez vous faire vacciner dès maintenant sont disponibles sur le site du réseau.

4

Les mesures d'hygiène restent essentielles pour prévenir la grippe : le lavage fréquent des mains, la limitation des contacts avec les patients grippés et éventuellement le port de masque FFP2.

5

Les principales cibles à la vaccination que le Réseau de Santé Paris Nord recommande :

Vaccin adjuvanté :

- Personnel de santé
- Patients de 2 ans à 64 ans ayant des facteurs de risque
- Entourage proche des sujets à risque

Vaccin sans adjuvant

- Nourrissons âgés de 6 à 24 mois, ayant des facteurs de risque
- Femmes enceintes, à partir du 2^{ème} trimestre de grossesse
- Personnes atteintes de maladie dysimmunitaire

6

Le Réseau de Santé Paris Nord déplore que l'organisation de la vaccination de la population ait été confiée à des centres. **Il propose que les généralistes puissent vacciner dans leur cabinet médical**, afin de pouvoir exercer leur rôle en matière de prévention, tel que la loi leur confie et que leurs patients le demande.

7

Pour plus d'informations sur le vaccin, les modalités de fabrication, et leurs effets secondaires :

- Diaporama sur le vaccin A(H1N1)2009 de la fédération française d'infectiologie : http://www.infectiologie.com/site/medias/alertes/grippe/Vaccin-H1N1-Federation_Francaise_Infectiologie.ppt
- Informations concernant la vaccination sur le site du ministère de la Santé et des Sports : <http://www.sante-sports.gouv.fr/grippe/vaccination/grippe-h1n1-v-informations-vaccination/grippe-h1n1-v-informations-vaccination.html>
- AFSSAPS : [http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Pandemie-grippale/Evaluation-et-production-des-vaccins-pandemiques/\(offset\)/2](http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Pandemie-grippale/Evaluation-et-production-des-vaccins-pandemiques/(offset)/2)
- Dossier sur la vaccination de la revue Prescrire : <http://www.prescrire.org/aLaUne/dossierGrippeVaccins15oct.php>

Le 15 novembre 2009

Le groupe de pilotage « Pandémie Grippale » du Réseau de Santé Paris Nord